

EXISTE-T-IL, DANS LA POPULATION CONSULTANT LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES, DES PATIENTS PORTEURS D'AOMI QUI AURAIENT UN BÉNÉFICE RÉEL À ÊTRE DIAGNOSTIQUÉS ?

Raoul C, Kandel O



Contexte

L'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, marqueur prédictif de morbi-mortalité cardio-vasculaire, est une maladie fréquente dont l'importance est sous-estimée par les médecins.

L'AOMI asymptomatique toucherait environ 10 à 15% des patients de plus de 65 ans, alors que d'après l'Observatoire de la Médecine Générale, elle n'est prise en charge que dans 3,5% des cas.

Objectifs

Objectif général :

Evaluer chez les patients consultant les médecins généralistes, la proportion de patients ayant une AOMI asymptomatique et la pertinence d'un dépistage optimisé ciblé.

Objectif opérationnel :


- Identifier les patients à risque d'AOMI
- Identifier les porteurs d'AOMI
- Calculer la proportion des patients, porteurs d'AOMI, qui aurait eu un réel bénéfice médical à être dépistée en tenant compte de ceux qui ont déjà le traitement recommandé (IEC, statine, AAP) et de ceux qui ont déjà été dépistés
- Calculer la proportion de patients, porteurs d'une AOMI, qui aurait des signes cliniques inconnus jusqu'alors.

Matériel et méthodes

Etude de type transversal, descriptive, rétrospective auprès des patients d'un cabinet de deux généralistes.

Inclusion des patients ayant été pris en charge pour un diagnostic lié aux facteurs de risque : tabac, dyslipidémie, diabète, hypertension artérielle, angor/IDM, sténose des artères rénales, sténoses carotidiennes.

8 variables retenues: Sexe, âge, type facteurs de risque, consultation pendant l'année de l'étude en 2008, artéritique connu, doppler artériel des membres inférieurs de moins de 5 ans, IPS inférieur à 0,9 et dépistage clinique des patients artéritiques



Graphique 1 : Modèle explicatif

Résultats

- Echantillon de l'étude = 190 patients identifiés avec les critères de l'ACC 21 % avaient déjà été dépistés et 7,5% avaient la trithérapie recommandée
- 28 des 118 patients dépistés étaient artéritiques soit 23,7 %
- Sur les 190 patients de l'étude, 14,7% étaient artéritiques avec un sex ratio H/F de 1.8
- Dépistage selon les facteurs de risque

Discussion

Concernant les facteurs de risque d'AOMI, les résultats étaient globalement comparables à ceux de la littérature.

Concernant les résultats du dépistage, ils sont comparables à l'étude PARTNERS :

- 29 % des patients étaient artéritiques (23,7 % dans notre étude)
- 55 % ont été diagnostiqués dans l'étude (43 % dans notre étude)
- 11 % des patients artéritiques étaient symptomatiques (8,7 % dans notre étude)

Limites : Seulement 65% des patients ont pu être dépistés. Les patients de plus de 80 ans ont été exclus de l'étude

Conclusion et perspectives

L'étude confirme qu'il existe bien une sous-estimation de l'AOMI en médecine générale. Les informations du dossier médical permettent d'identifier les patients porteurs de facteurs de risque d'artérite. D'un point de vue pratique le dépistage pourrait être optimisé en ciblant les patients coronariens, diabétiques et tabagiques.

La SFMG remercie les médecins généralistes qui participent anonymement à l'OMG en fournissant leurs données de prise en charge. Le SFMG remercie les médecins généralistes qui ont participé au focus groupe.

Les auteurs de cette étude déclarent ne pas avoir de conflit d'intérêt.

Pour plus d'informations :
Contact : p.clerc@sfgm.org
SFGM : www.sfgm.org
OMG : http://omg.sfgm.org

Tableau III : Liste des variables étudiées

VARIABLES	MODALITES	JUSTIFICATION
Sexe patient	Homme femme	Description échantillon
Age patient	En années	Description échantillon
Type facteurs de risque	Age, RC correspondants	Description échantillon
Consultation en 2008	Oui non	Affinage échantillon
Artéritique connu	Oui non	Affinage échantillon
Doppler artériel des MI	Oui non	Affinage échantillon
IPS inférieur à 0,9	Oui non	Variable analysée
Etat clinique des positifs	Oui non	Variable analysée